

# Tratamiento quirúrgico en los pacientes diagnosticados de carcinoma broncopulmonar en Castilla y León y Cantabria durante el año 2007

Heras Gómez F, Hernández Hernández JR, Cordovilla Pérez MR, Antolín García T, Bollo de Miguel E, Cabanyes Candela S, García Rico C, y Grupo de Estudio CB07-SOCALPAR

## INTRODUCCIÓN:

La cirugía con intención curativa es el tratamiento de elección en los pacientes con carcinoma broncopulmonar (CB).


## OBJETIVOS:

Estudio de las características de un grupo de pacientes diagnosticados de CB en Castilla y León y Cantabria durante el año 2007 a los que se ha realizado tratamiento quirúrgico.

## PACIENTES Y MÉTODO:

Estudio prospectivo multicéntrico. Incluye a todos los pacientes diagnosticados de CB en Castilla y León y Cantabria durante el año 2007.


Se han estudiado las características de un grupo de 159 pacientes a los que se ha realizado tratamiento quirúrgico con intención curativa. Se han comparado los datos con los de un estudio similar realizado en el año 1997 en Castilla y León.







## RESULTADOS:

Muestra de 159 pacientes (129 varones y 30 mujeres). Edad media 65 años (varones 67 años, mujeres 59 años).


### Hábito tabáquico




### Varones



### Estadificación clínica y patológica (TNM 2002)



### Tipo histológico



## CONCLUSIONES:

Dos tercios de los pacientes intervenidos se encontraban en estadio clínico I (TNM 2002).

El estadio patológico ha sido inferior al clínico en los pacientes en estadios IA (5,46%) y IIB (3,37%)

Predominio histológico del carcinoma epidermoide.

Carcinoma de células pequeñas en 4,63% de los pacientes